



# ACUAPEN

Antibiótico enzimático

## FORMULA

Cada ml contiene:

Penicilina G Procaínica	300,000 U.I
Procaína clorhidrato	10 mg.
Enzima proteolítica	25 U.I.
Vehículo, c.b.p.	1 ml.

Reg. SADER Q-0060-071

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

## FORMA FARMACÉUTICA

Solución acuosa inyectable

## DESCRIPCIÓN

Antibiótico enzimático. Solución acuosa

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda

## INDICACIONES

Formulación acuosa con penicilina de rápida acción y efecto inmediato. Antibiótico con niveles hemáticos prolongados, en bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos, para el tratamiento de procesos infecciosos ocasionados por bacterias sensibles a la acción de la fórmula.

La procaína clorhidrato presente en la formulación produce insensibilidad en el sitio de aplicación, por lo cual la inyección local de este producto no produce dolor.

La fórmula contiene una enzima proteolítica (*L. Caricaceae*) como coadyuvante que inhibe la reacción inflamatoria excesiva, al contribuir en la degradación de las proteínas plasmáticas que invaden el espacio intersticial durante el proceso agudo de la inflamación, facilitando su eliminación por el sistema linfático o sanguíneo. Así mismo, participa en la eliminación de mediadores de la inflamación, como la bradiquinina, la que despolariza y elimina. Con lo anterior, se logra que el edema inflamatorio sea reabsorbido más rápidamente y se reduzca logrando una disminución muy significativa del dolor y una restitución de la microcirculación, con lo que la eliminación de los productos es más rápida y eficiente.

## ADVERTENCIAS

Agítese bien antes de usarse. No administrar por vía intravenosa. No se administre a becerros de engorda. No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano. No se administre este producto en: becerros: 7 días, Bovinos para carne: 4 días, Ovinos: 8 días, Porcinos: 6 días antes del sacrificio para consumo humano. La leche de los animales tratados no deberá consumirse hasta 72 horas después de la última aplicación. No administrar simultáneamente con tratamiento de anticoagulantes. No administre más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación. En el caso de hipersensibilidad a la fórmula suspéndase su aplicación. Consérvese en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 25°C

## PRESENTACIONES

Frasco con 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

## USO EN:



al servicio de la Salud Animal

Contacto: [ventas@labfiori.com](mailto:ventas@labfiori.com) | [www.labfiori.com](http://www.labfiori.com) | Tel. 442.2252461 y 442.2252471

ANTIBIOTICOS