



PRODUCTOS VETERINARIOS

al servicio de la Salud Animal

FIOMASTIN

Suspensión intramamaria. Antibiótico con Dexametasona.

FORMULA

Cada jeringa de 10 ml contiene:

Neomicina sulfato equivalente a 300 mg

de Neomicina

Dexametasona fosfato sódico

equivalente a 2 mg

de Dexametasona.

Vehículo, c.b.p. 10 ml.

Reg. SADER Q-0060-102

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión Intramamaria

DESCRIPCIÓN

Suspensión antibiótica de amplio espectro

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramamaria

INDICACIONES

Para el tratamiento de la mastitis.

DOSIS

Bovinos: 1 Jeringa por cuarto a tratar, cada 24 horas, por un período de 3 a 5 días. Previamente lavar y desinfectar los pezones e introducir por el canal mamario el contenido indicado de la jeringa en cada glándula mamaria a tratar, después de cada ordeña dando masaje hacia arriba para difundir completamente el producto. La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS

Agítase antes de usarse, no utilice la leche de los animales tratados hasta después de 3 días después de la última aplicación. Utilícese con precaución en animales hipersensibles a los aminoglucósidos y corticosteroides. Consérvese en lugar fresco y seco.

PRESENTACIONES

Jeringa con 10 ml, cubeta conteniendo 36 jeringas de 10 ml

USO EN:



al servicio de la Salud Animal

Contacto: ventas@labfiori.com | www.labfiori.com | Tel. 442.2252461 y 442.2252471