



PRODUCTOS VETERINARIOS
al servicio de la Salud Animal

FIORI ESTREPTOENZIM

Antibióticos con enzimas proteolíticas y analgésico y antipirético.

FORMULA

Cada Millón de UI contiene:

Cada frasco con Polvo estéril contiene:	1 millón	2 millones	4 millones	6 millones
Penicilina G procaína	500,000 U.I.	1,000,000 U.I.	2,000,000 U.I.	3,000,000 U.I.
Penicilina G sódica	312,500 U.I.	625,000 U.I.	1,250,000 U.I.	1,875,000 U.I.
Penicilina G benzatina	187,500 U.I.	375,000 U.I.	750,000 U.I.	1,125,000 U.I.
Estreptomina base (como sulfato)	500 mg	1 mg	2 g	3 g
Tripsina	15,625 U.N.F.	32,250 U.N.F.	62,500 U.N.F.	93,750 U.N.F.
Quimotripsina	12,500 U.N.F.	25,000 U.N.F.	50,000 U.N.F.	75,000 U.N.F.

Reg. SADER Q-0060-031

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

El frasco con diluyente estéril contiene:

Dipirona sódica	400 mg	400 mg	800 mg	12 g
Vehículo, c.b.p.	10 ml	10 ml	20 ml	30 ml

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo estéril para suspensión inyectable.

DESCRIPCIÓN

Antibiótico con enzimas proteolíticas y acción analgésica y antipirética. Producto de elección para hembras gestantes.

INDICACIONES

Sinergia antibiótica con enzimas proteolíticas para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes gram-negativos y gram-positivos. Por su formulación permite la resolución de procesos infecciosos e inflamatorios, como: mastitis, metritis, bronconeumonías, abscesos, nefritis, etc. Por las características del producto es de elección inicial en los tratamientos y para los animales gestantes es seguro, no causando daños a las crías.

ADVERTENCIAS

Una vez preparada la suspensión puede conservarse 5 días en refrigeración. No usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No usar para consumo humano la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 72 horas después de la última aplicación. No administre en animales hipersensibles a los antibióticos betalactámicos

PRECAUCIONES

Mantenga el producto en su envase bien cerrado en lugar fresco y seco a temperatura ambiente, protegido de la humedad y la luz solar directa. Una vez preparada la mezcla puede conservarse 5 días en refrigeración. No deberá ser manejado por personal sensible a las penicilinas.

PRESENTACIONES

Frasco con: 1Millón, 2 Millones, 4 Millones, 6 Millones,
Diluyente 10 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml

USO EN:



DOSIS

Todas las especies: 20,000 a 40,000 U.I por kg de peso

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda

al servicio de la Salud Animal

Contacto: ventas@labfiori.com | www.labfiori.com | Tel. 442.2252461 y 442.2252471