

IVERCUANTEL

Antiparasitario de amplio espectro (endoparasitocida, sarnicida y piojicida)

FORMULA

Cada tableta de 200 mg contiene:

Ivermectina	2 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente, c.b.p.	1 tableta

Reg. SADER Q-0060-048

La venta de este medicamento requiere receta médica.
Consulte a su Médico Veterinario.

FORMA FARMACÉUTICA

Tabletas

DESCRIPCIÓN

Contiene dos desparasitantes que se potencian, útil para el tratamiento de casi todos los parásitos externos e internos, así como de sus diferentes formas adultas y larvianas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

INDICACIONES

Este producto se recomienda cuando se necesite un tratamiento eficaz en caso de infestación parasitaria en pequeñas especies o cuando se pretenda prevenir estas.

Parasiticida de amplio espectro, a base de una combinación de dos fármacos que actúan sinérgicamente contra gusanos planos y redondos tanto en su forma larvaria como adultas del sistema gastroentérico, pulmonar, cardíaco y renal en perros y gatos, atacando a *Toxocaras*, *Tenias*, *Ancylostomas*, *Dirofilarias*, *Capillarias*, *Uncinarias*, Piojos, Pulgas y Acaros productores de sarna.

El efecto de este fármaco en contra de este tipo de gusanos consiste en la destrucción de la membrana tegumentaria, ejerciendo un marcado efecto residual, evitando reinfestación por periodos prolongados.

La ivermectina y praziquantel se absorben rápidamente alcanzando niveles máximos de concentración sanguínea en 30 a 60 minutos. Actúa sobre las formas parasitarias por medio del torrente sanguíneo, eliminándolos en forma más rápida que los medicamentos que actúan a nivel intestinal.

PRESENTACIONES

Caja con 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 tabletas

USO EN:



al servicio de la Salud Animal

IVERQUANTEL

Antiparasitario de amplio espectro (endoparasiticida, sarnicida y piojicida)

Reg. SADER Q-0060-048

La venta de este medicamento requiere receta médica. Consulte a su Médico Veterinario.

FORMULA

Cada tableta de 200 mg contiene:

Ivermectina	2 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente, c.b.p.	1 tableta

DOSIS

Caninos y Felinos: Administrar 1 tableta por cada 10 kg de peso en ayunas una sola toma. Para el tratamiento de infestaciones severas por céstodos o nemátodos se sugiere administrar una segunda dosis.

En casos severos de infestaciones por ácaros se deberá repetir el tratamiento a los 14 días.

En infestación de pulgas repetir el tratamiento cada 30 días, en época de estas.

En caso de parasitosis por *Strongyloides stercoralisse* se sugiere repetir el tratamiento a los 15 días.

En caso de parasitosis por *Uncinaria stenocephala* se sugiere repetir el tratamiento a los 30 días.

En caso de parasitosis por *Ancylostoma tubaeforme* y *Ancylostoma braziliense* se sugiere repetir el tratamiento a los 30 días.

En caso de parasitosis por *Pneumonyssus caninum* o *Dipilidium caninum* se sugiere repetir el tratamiento a los 21 días.

Para la prevención del desarrollo de *Dirofilaria immitis*, se sugiere repetir el tratamiento cada 30 días, iniciando dentro de los 30 días posteriores a la exposición inicial del perro o gato con mosquitos y administrar la dosis final 30 días después de la última exposición a los mosquitos.

Las zonas con poblaciones continuas de mosquitos requieren terapéutica durante todo el año con dosis mensuales, de esta manera se minimiza la oportunidad de desarrollar gusanos adultos del corazón

Aves: Fraccionar la tableta relacionado al peso del animal y repetir a criterio del Médico Veterinario

La dosis y frecuencia puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS

En el caso de animales que vivan en zonas tropicales o las mascotas que viajen a esas zonas se recomienda la utilización de este producto cada 28 días para evitar el desarrollo de larvas de *Dirofilaria immitis* (gusano del corazón).

No administrar a raza de perros sensibles a la toxicidad de la ivermectina como: Collie, pastor escocés, pastor australiano y en algunos casos doberman y antiguo pastor inglés.

No se administre a perros menores de 6 semanas de edad, perros viejos ni gatos menores de 6 semanas de edad.

Aproximadamente el 5% de los perros con microfilaria puede presentarse vómito y temblores posteriores al tratamiento.

Para evitar sobredosisificación verifique el peso del animal antes de dosificar. La sobredosisificación puede originar: depresión, debilidad muscular y vómito.

La mascota debe ser examinada por el Médico Veterinario antes de administrar el tratamiento contra microfilaria ya que si existe *Dirofilaria immitis* adulta, deberá administrarse un tratamiento específico bajo vigilancia médica.

La ivermectina afecta en forma adversa a los organismos acuáticos, por lo que los recipientes vacíos y residuos deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.

Mantener el producto en su envase herméticamente cerrado en lugar fresco y seco a temperatura ambiente

PRESENTACIONES

Frasco con 50 ml y 250 ml.

USO EN:



al servicio de la Salud Animal

Contacto: ventas@labfiori.com | www.labfiori.com | Tel. 442.2252461 y 442.2252471